ช่องทางด่วนสำหรับการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคที่ IPD

ผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่มีอาการไอนานกว่า 2 สัปดาห์ร่วมด้วย ได้รับไว้รักษาใน Ward ใดๆ

↓

พยาบาลเวร:

- สั่งตรวจเสมหะ AFB X 3 วันทันที (ไม่ต้องรอให้แพทย์สั่ง) โดยให้ผู้ป่วยขากเก็บเสมหะในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเหมาะสมและห้ามขากเก็บเสมหะในห้องน้ำเด็ดขาด
- ให้ผ้าเช็ดหน้าหรือ Mask หรือทิชชูแก่ผู้ป่วยปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม และอาจพิจารณาแยกผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคออกจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ ตามความเหมาะสมระหว่างรอผลเสมหะ AFB

↓

เจ้าหน้าที่ชันสูตร:

- ดำเนินการตรวจเสมหะ AFB ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าคิวกับการตรวจสิ่งตัวอย่างอื่นๆ
- หากผลเสมหะ AFB ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งเป็นบวก เจ้าหน้าที่ชันสูตรรีบแจ้งผลเสมหะ AFB เป็นบวกนั้นแก่พยาบาล IPD ทันที "ทางโทรศัพท์"

↓

พยาบาลเวร:

- รีบรายงานแพทย์เพื่อสั่งการรักษาวัณโรคที่เหมาะสม
- รีบจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
- ทำ DOT ทุกครั้งที่ผู้ป่วยรับประทานยาวัณโรค
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย